

Information inför laserbehandling av öga

Du har fått tid för laserbehandling av höger/vänster öga.

För att kunna utföra behandlingen på bästa möjliga sätt måste pupillen vidgas.

Förberedelser inför behandling

I brevet med denna information har du fått två små flaskor med ögondroppar. Dropparna ska vidga din pupill.

Ögondroppar:

- Tropikamid 0,5% (TRO 0,5). Flaskan är rödmärkt!
- Phenylephrine (PHNL2,5).

Så här tar du ögondropparna:

- Cirka 45 minuter innan besöket ska du droppa en droppe med läkemedlet Phenylephrine i det öga som ska behandlas.
- Efter cirka 5 minuter ska du droppa en droppe med läkemedlet Tropikamid (rödmärkt flaska) i det öga som ska behandlas.
- Efter ytterligare 5 minuter ska du droppa en till droppe av läkemedlet Tropikamid (rödmärkt flaska) i det öga som ska behandlas.

Detta ger en vidgning av pupillen som varar några timmar. Du kommer att uppleva att du tillfälligt ser sämre i och med att pupillen vidgas.

Om du har svårvidgade pupiller

Om du sedan tidigare vet att dina pupiller brukar vara svårvidgade kan du börja ta ögondropparna 60 minuter innan besöket. När du tagit dropparna enligt beskrivningen ovan kan du ta en extra droppe av Tropikamid (den rödmärkta flaskan).