

Information om Atropindroppar

Syftet med undersökningen

Avsikten med undersökningen är att kontrollera om barnet har nytta av någon form av glasögon (till exempel för närsynthet, översynthet eller brytningsfel) och för att kunna se in i och bedöma ögonbotten och dess näthinna.

Undersökningen ger riktiga värden endast om droppningen utförts på angivet sätt.

När ska dropparna tas?

Man droppar en droppe i varje öga, morgon, middag samt kväll dagen innan undersökningen, samt på undersökningsdagens morgon. Pupillen blir stor redan efter första droppen men den linsavslappning som eftersträvas kräver flera droppar.

Hur ska dropparna tas?

Barnet lägger sig på rygg. Låt barnet blunda lätt och droppa en droppe i vardera öga i ögonvrån, därefter kan barnet titta upp i taket, eventuellt kan man hjälpa barnet att öppna ögonen. Viktigt att man förvisar sig om droppen kommer in i ögat. Man kan även droppa när barnet sover. Torka huden runt om efter droppningen.

Vilken effekt har ögondropparna?

Eftersom pupillen förstoras får barnet svårt att se små föremål på nära håll. Starkt ljus kan vara besvärande.

I mycket sällsynta fall kan barnet reagera med torrhet i munnen, rodnande kinder och lite temperaturstegring. Avbryt då droppningen och ring ögonmottagningen.

Det tar 3–7 dagar efter undersökningen innan barnet börjar se normalt. Pupillen kan förbli stor ända upp till 20 dagar efter droppningen.