

Till dig som ska genomgå fotodynamisk behandling med Visudyne

Räkna med att besöket hos oss tar några timmar.

Du har en typ av förändring på ögonbotten där du kan ha nytta av fotodynamisk behandling med Visudyne.

Behandlingen innebär att man sprutar in ett läkemedel (Visudyne), ett ljuskänsligt ämne i ett blodkärl i armen. Ämnet söker sig till ögat och samlas i de sjuka kärlförändringarna på ögonbotten. Därefter belyses kärlförändringarna med ett svagt laserljus. Detta ljus aktiverar det ljuskänsliga ämnet och därmed förstörs de onormala kärlen.

Leversvikt samt sjukdomen porfyri utgör hinder för Visudynebehandling.

Att tänka på 48 timmar efter behandlingen

Eftersom behandlingen tillfälligt gör dig extra ljuskänslig måste du undvika att utsätta ögon och hud för starkt ljus de närmaste 48 timmarna efter behandling. Vanliga solskyddsmedel hjälper inte mot denna typ av ljuskänslighet.

Du kommer att få låna ett par solglasögon av oss.

Att undvika efter behandlingen

- Utsätt dig inte för halogenbelysning, operationslampor och tandläkarbelysning.
- Du bör inte köra bil samma dag som behandlingen.

Vad du kan göra efter behandlingen

- Normal inomhusbelysning är inte skadlig.
- Du kan titta på TV och sitta vid dator som vanligt.
- Om du vistas utomhus, använd då både solglasögon, täckande klädsel och huvudbonad.

Återbesök sker vanligtvis 3 månader efter behandlingen på ditt hemortssjukhus

Kontakt

Du kan kontakta Ögonmottagningen via webbplatsen 1177.se eller genom att ringa 090–785 91 56