

Reversibilitetstest

Ett reversibilitetstest är ett enkelt test för att ta reda på om din lungfunktion förbättras efter inhalation av luftrörsvidgande medicin.

Testen går till enligt följande

1. En enkel lungfunktionsmätning (vitalogram) blåses. Man mäter därigenom den totala mängden luft du kan andas ut efter maximal inandning, dels den volym luft du snabbt kan blåsa ut under en sekund.
2. Därefter får du inhalera ett luftrörsvidgande läkemedel.
3. Läkemedelseffekten inväntas under ungefär 20 minuter.
4. Slutligen görs den enkla lungfunktionsmätningen (vitalogram) igen.
5. Resultaten från de båda "blåsningarna" jämförs och bedöms sedan av din läkare.

För att testen ska bli rättvisa så är det viktigt att följande anvisningar följs

- Luftrörsvidgande inhalation (spray eller pulver) såsom Ventoline, Bricanyl, Berotec, Inspiryl, Airomir, Buventol, Salbumatol, Atrovent, Spiriva eller Bufomix får **inte** användas senare än sex timmar innan testen ska genomföras.
- Servent, Foradil, Seretide Forte, Symbicort eller Oxis får **inte** användas 24 timmar före testet.
- Luftrörsvidgande tabletter (Bricanyl, Bricanyl Depot, Bambec, Ventoline, Ventoline Depot) och klysma (Teovent, Theofyllamin) får **inte** användas 24 timmar före testet.
- Den nya tabletten Singulair ska du helst **inte** ta kvällen innan testet.
- Övrig medicinering, inklusive inhalationskortison (Becotide, Pulmicort, Asmanex) och/eller kortisontabletter (till exempel Betapred och Prednisolon) tas som vanligt.

Om du inte klarar av att vara utan ditt eller dina luftrörsvidgande läkemedel så länge som vi föreskrivit, ska du givetvis ta den/dom. Det är då viktigt att du meddelar detta till den som gör reversibilitetstesten.