

Kolposkopi

Du är inbokad för ett läkarbesök med kolposkopi.

En kolposkopi görs om du har eller har haft cellförändringar och/eller HPV-infektion. Vid en kolposkopi kan man fastställa om du har cellförändringar och i så fall vilken grad av cellförändringar det är. Det är därför viktigt att du kommer på ditt besök. Mer information kan du läsa på webbplatsen 1177.se.

Viktig information inför undersökningen

- Dygnet före undersökningen ska du inte föra in något i slidan eller ha samlag.
- Du ska inte ha menstruation.
- Om du använder blodförtunnande medel som till exempel Waran, Trombyl, Persantin eller Plavix är det mycket viktigt att du uppger detta när du kommer för ditt besök.
- Om du är gravid skall du ringa till gynmottagningen och meddela detta så snart som möjligt, på telefonnummer 090-785 91 65.

Hur går undersökningen till?

Läkaren börjar med att ta ett cellprov. Därefter tittar läkaren på livmodertappen med hjälp av ett kolposkop. Ett kolposkop kan liknas vid ett slags mikroskop där man kan titta på livmodertappen i stark förstoring. Efter inspektion penslas livmodertappen med två olika lösningar. Först med en ättikslösning, vilket ibland kan ge en svidande känsla. Därefter med en jodlösning som man inte brukar uppleva något obehag av. Beroende på vad läkaren ser tas vid behov ett par mindre vävnadsprover från livmodertappen. I samband med provtagning kan du uppleva en smärta som kan liknas vid menstruationsvärk.

Bra att veta efter undersökningen

- Första dagen bör du ta det lugnt och inte utöva ansträngande fysisk aktivitet. Har man ett tungt fysiskt krävande arbete kan det vara bra att vara hemma och vila på undersökningsdagen.
- Det är vanligt med en lättare blödning efter behandlingen. Det är helt normalt och avtar inom 1 vecka.
- Jodlösningen som penslas på livmodertappen är brunfärgad, vilket gör att du kommer att ha brunaktiga flytningar ett par dagar.
- Undvik samlag, bad och att använda tampong så länge som det blöder, på grund av risk för infektion.
- Vävnadsprov som tas skickas för mikroskopisk undersökning. Det kan ta upp till 8 veckor innan svaret anländer. Besked får du via brev eller enligt överenskommelse.

Smärta och smärtstillande

Under första veckan kan du ha lättare ömhet i underlivet eller smärta som påminner om menstruationsvärk. Smärtlindring rekommenderas i form av paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil. Vid behov kan ytterligare smärtstillande behövas, så som Ibuprofen eller Voltaren.

Uppföljning

Tidpunkt för uppföljningen beror på vad vävnadsprovet visar. Information om detta får du i samband med provsvar.

Kontakt

Komplikationer efter undersökningen är ovanliga, men om du får besvär, såsom större blödning, illaluktande flytning, feber eller kraftig smärta, ring dagtid i första hand till gynmottagningen, telefonnummer 090-785 91 65. Kvällar och helger ringer du till sjukvårdsupplysningen, telefon 1177. Vid akuta besvär, åk till akutmottagningen.