

Medicinering i anslutning till operation

För att minska risken för blödning vid operationen eller om ingreppet innebär att du ska få rygg- eller annan bedövning ska vissa blodförtunnande mediciner undvikas. Flera smärtstillande medel påverkar blodets levringsförmåga och ska undvikas inför operation.

För att minska risken för infektioner efter operation bör vissa mediciner som påverkar immunförsvaret undvikas.

Individuell bedömning måste alltid göras om du är:

- Transplanterad (oavsett vilket organ).
- Hjärtopererad.
- Haft en hjärtinfarkt eller stroke senaste 12 månaderna.
- Nyligen varit svårt sjuk i annan hjärt- och kärlåkomma.
- Har njur- eller leversvikt.

Om så är fallet måste du kontakta din ordinarie läkare i god tid inför operationen.

Tar du blodförtunnande medicin, fråga om det är lämpligt att göra uppehåll med den eller om operationen ska skjutas fram.

Tar du medicin som påverkar immunförsvaret är anledningen till medicineringen avgörande om du kan göra uppehåll eller måste fortsätta ta medicinerna som vanligt. Vid osäkerhet måste du kontakta din ordinarie läkare eller operationsplaneraren vid kliniken där du ska opereras.

Du som har diabetes ska göra uppehåll med Metformin i 2 dygn innan operation. Övriga diabetestabletter tas som vanligt utom operationsdagen. Du måste kontrollera blodsocker och om det är högt. Kontakta distriktssköterska för att få hjälp.

Naturläkemedel ska du göra uppehåll med veckan innan operation, för vissa kan ge ökad risk för blödning.

En lista med blodförtunnande och smärtstillande läkemedel och hur långt i förväg inför operation du bör göra uppehåll med dem finns i slutet av denna bilaga.

Om du vet eller tror att du tar något läkemedel som påverkar blodets levringsförmåga men som inte står på listan, ska du kontakta operationsplaneraren.

Du som har behandling mot reumatisk sjukdom följer de anvisningar du fått av din läkare.

Du som är transplanterad eller har njur- eller leversvikt måste alltid rådgöra med din behandlande läkare.

Förändring av medicinering före operation

Waran: uppehåll 3–5 dygn innan operation.

OBS! ta kontakt med den enhet som sköter din Waran-behandling innan operationen.

Lista med övriga blodförtunnande och smärtstillande läkemedel och hur långt i förväg inför operation du bör göra uppehåll med dem:

- Albyl minor – gör uppehåll i 7 dygn innan operation
- Alganex – gör uppehåll i 12 dygn innan operation
- Alpoxen – gör uppehåll i 2 dygn innan operation
- Ardinex – gör uppehåll i 1 dygn innan operation
- Arhrotex – gör uppehåll i 1 dygn innan operation
- Asasantin retard – gör uppehåll i 7 dygn innan operation
- Asprin – gör uppehåll i 7 dygn innan operation
- BamyI – gör uppehåll i 7 dygn innan operation
- BamyI koffein – gör uppehåll i 7 dygn innan operation
- BamyI s – gör uppehåll i 7 dygn innan operation
- BamyI s koffein – gör uppehåll i 7 dygn innan operation
- Brexidol – gör uppehåll i 14 dygn innan operation
- Bilique – gör uppehåll i 7 dygn innan operation
- Brufen – gör uppehåll i 1 dygn innan operation
- Buprefarm – gör uppehåll i 1½ dygn innan operation
- Buprenorfine – gör uppehåll i 1½ dygn innan operation
- Clopidrogel – gör uppehåll i 5 dygn innan operation
- Clorocard – gör uppehåll i 5 dygn innan operation
- Diklofenak – gör uppehåll i 1 dygn innan operation
- Efient – gör uppehåll i 7 dygn innan operation
- Eliquis r – gör uppehåll i 2 dygn innan operation
- Grepid – gör uppehåll i i 5 dygn innan operation
- Ibumetin – gör uppehåll i 1 dygn innan operation
- Ibuprofen – gör uppehåll i 1 dygn innan operation
- Ipren – gör uppehåll i 1 dygn innan operation
- Klopdrogel – gör uppehåll i 5 dygn innan operation
- Magnecyl – gör uppehåll i 7 dygn innan operation
- Magnecyl koffein – gör uppehåll i 7 dygn innan operation
- Modifenac – gör uppehåll i 1 dygn innan operation
- Naprosyn – gör uppehåll i 2 dygn innan operation
- Naproxen – gör uppehåll i 2 dygn innan operation
- Norspanplåster – gör uppehåll i 1½ dygn innan operation
- Orudis – gör uppehåll i 1 dygn innan operation
- Orudis Retard – gör uppehåll i 2 dygn innan operation

- Piroxikam – gör uppehåll i 14 dygn innan operation
- Plavix – gör uppehåll i 7 dygn innan operation
- Pradaxa r – gör uppehåll i 4 dygn innan operation
- Prodon – gör uppehåll i 1 dygn innan operation
- Pronaxen – gör uppehåll i 2 dygn innan operation
- Relifex – gör uppehåll i 9 dygn innan operation
- Temgesic – gör uppehåll i 1½ dygn innan operation
- Tenoxikam – gör uppehåll i 14 dygn innan operation
- Ticlid – gör uppehåll i 10 dygn innan operation
- Tradil – gör uppehåll i 10 timmar innan operation
- Treo – gör uppehåll i 7 dygn innan operation
- Treo comp – gör uppehåll i 7 dygn innan operation
- Tombyl – gör uppehåll i 3 dygn innan operation
- Voltaren – gör uppehåll i 1 dygn innan operation
- Xarelto – gör uppehåll i 3 dygn innan operation