

Information inför penicillinprovokation

Penicillinallergi misstänks ofta på felaktiga grunder. Samtidigt är det en av de vanligaste läkemedelsallergierna och kan ge svåra reaktioner.

Penicillin tillhör det antibiotika vi använder mest vid infektioner. Det är därför viktigt att ställa rätt diagnos, både för att identifiera allergiska patienter och för att undvika felaktig stämpel om allergi. Det är därför viktigt att ditt barn genomgår denna provokation och att ni inte avbokar tiden.

Innan provokationen:

- Barnet ska inte ta antihistamintabletter (exempelvis Alerius, Desloratadin, Loratadin, Kestine, Zyrlex) tre dagar före provokationen.
- Barnet ska inte ha infektion eller feber vid provokationstillfället.

Så här gör vi penicillinprovokationen:

Barnet får göra ett pricktest med penicillin. Barnet intar därefter det penicillin som gett symtom under övervakning av sköterska. Penicillinprovokationen inklusive pricktestet före tar totalt mellan 1–4 timmar. Under den här tiden får ni inte lämna barnmottagningen och om barnet behöver gå på toaletten ska inte dörren vara låst. Det är bra om ni tar med fika och eventuellt någon sorts förströelse.

Cirka en vecka efter provokationen tar vi telefonkontakt med er föräldrar för att få information om barnet har haft sena allergiska reaktioner som till exempel magont eller utslag.

Provokationer är resurskrävande och väntelistan lång. Det är därför viktigt att ni avbokar tiden så snart som möjligt om ni får förhinder så vi hinner kalla en annan patient!

Välkommen!