

Koloskopiundersökning av tjocktarmen - Laxabon

Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel (till exempel Eliquis, Brilique, Clopidogrel, Pradaxa, Waran) eller om du har en inopererad hjärtklaff så ska läkemedlet tillfälligt sättas ut före undersökningen. Detta ska framgå på din kallelse. Målvärde för PK-INR vid Waran-behandling är 1,5. Trombyl kan kvarstå.

7 dagar innan undersökning

- Undvik fiberrik kost (kärnor, frön, nötter, grovt bröd, trådiga- och skalomslutna grönsaker/frukter). I övrigt kan du äta som vanligt.
- Avstå järntabletter.

Dagen innan undersökning

- Ät frukost och lunch som vanligt
- Ät ingen fast föda efter kl. 12.00
- Drink rikligt med klara vätskor dagen innan. Exempel på detta är: te, kaffe, buljong, saft, juice, vätskeersättning.

Förberedelser

Dagen före undersökningen ska du dricka 4 liter med Laxabon med start kl. 15.00. Blanda 1 påse med 1 l vatten, tillsätt bara kranvatten. Drink 1 glas var 10:e minut. Avsluta senast kl. 20.00. Rör på dig så sker tarmtömningen fortare. Tuggummi får användas under förberedelsen.

Undersökningsdagen

3–4 timmar innan ditt planerade besök ska du dricka 2 l Laxabon. Du får även dricka klar vätska. Ska du göra en gastroskopi måste du vara fastande 2 timmar före.

Du kan förbereda dig på mottagningen samma morgon men du måste meddela mottagningen detta via telefon 090-785 44 60 eller via 1177.se.

Har du lång resväg finns övernattningsrum där du kan göra alla förberedelser inför undersökningen. Du bokar själv på 0950–39515.

Vissa patienter behöver läkemedel i samband med undersökningen och man får då inte köra bil samma dag.