

Inför gastroskopiundersökningen

- Inför gastroskopiundersökningen i narkos är det viktigt att magsäcken är helt tom.
- Mat och dryck får intas fram till och med midnatt, därefter total fasta.
- Värktabletter av NSAID-typ (Diklofenak, Voltaren, Ipren, Treo med flera) ska undvikas 5 dagar innan undersökning.
- Om du står på Waran, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis kontakta Antikoagulationsmottagningen, 090-785 93 66, i god tid innan besöket.
- Har du en pacemaker eller står på Plavix/Clopidogrel, Efient eller Brilique kontakta Endoskopienhet Umeå snarast, 090-785 93 03.

Information om gastroskopi

Gastroskopi är en undersökning av matstrupen, magsäcken och första delen av tolvfingertarmen. Undersökning utförs med ett böjligt instrument. För att skydda dina tänder och instrumentet kommer du att ha en bitring i munnen.

Innan undersökningen startar får du ett läkemedel, som minskar gasbildningen i magsäcken.

Under undersökningen fylls magsäcken med luft, vilket kan leda till rapningar under och efter undersökningen.

Vid behov tas vävnadsprover för mikroskopisk undersökning.

Bilkörning är inte tillåten 24 timmar efter narkos.