

Information om gastroskopi

Gastroskopi är en undersökning av matstrupen, magsäcken och första delen av tolvfingertarmen. Undersökning utförs med ett böjligt instrument. För att skydda dina tänder och instrumentet kommer du att ha en bitring i munnen.

- Önskar du lugnande medicin i samband med gastroskopin, kontakta endoskopienheten Umeå på telefon 090–785 93 03
- Det är inte tillåtet att köra bil 24 timmar efter undersökningen om lugnande/smärtstillande läkemedel givits.

Inför gastroskopiundersökningen

Inför gastroskopiundersökningen är det viktigt att magsäcken är helt tom. Från och med sex timmar innan undersökningen ska du fasta. Med fasta menas att du inte äter någon mat eller dricker någon vätska.

Förberedelser hemma - sju dagar innan undersökningen

Detta skall undvikas sju dagar innan undersökningen:

- Järntabletter
- Värktabletter av NSAID-typ (Diklofenak, Voltaren, Ipren, Treo eller liknande)

För dig med blodförtunnande läkemedel eller implantat

Om du tar något av de blodförtunnande läkemedlen i nedan lista måste du kontakta Antikoagulationsmottagning Umeå på 090–785 93 66 eftersom de måste sättas ut.

- Waran
- Pradaxa
- Xarelto
- Eliquis
- Lixiana

Om du däremot

- Har pacemaker eller annat inplantat i hjärta eller hjärna till exempel ICD eller DBS
- Tar blodförtunnande läkemedel av typen Plavix, Clopidogrel, Efient eller Brilique

Ska du kontakta Endoskopienheten Umeå på 090–785 93 03

Förberedelser på Endoskopienhet Umeå inför undersökningen

- Du kan få en kanyl i ett blodkärl, för eventuellt smärtstillande/lugnande medel