

Information om gastroskopi i narkos

Gastroskopi är en undersökning av matstrupen, magsäcken och första delen av tolvfingertarmen. Undersökning utförs med ett böjligt instrument. För att skydda dina tänder och instrumentet kommer du att ha en bitring i munnen.

- Det är inte tillåtet att köra bil inom 24 timmar efter narkos

Inför gastroskopiundersökningen

Inför gastroskopiundersökningen är det viktigt att magsäcken är helt tom. Från och med klockan 24.00 dagen innan undersökningen ska du fasta. Med fasta menas att du inte äter någon mat, dricker vätska eller använder tobak.

Förberedelser hemma - sju dagar innan undersökningen

Sju dagar innan undersökningen ska du undvika

- Järntabletter
- Värktabletter av NSAID-typ (Diklofenak, Voltaren, Ipren, Treo eller liknande)

För dig med blodförtunnande läkemedel eller implantat

Om du tar något av de blodförtunnande läkemedlen i nedan lista måste du kontakta Antikoagulationsmottagning Umeå på 090–785 93 66 eftersom de måste sättas ut.

- Waran
- Pradaxa
- Xarelto
- Eliquis
- Lixiana

Om du däremot

- Har pacemaker eller annat inplantat i hjärta eller hjärna till exempel ICD eller DBS
- Tar blodförtunnande läkemedel av typen Plavix, Clopidogrel, Efient eller Brilique

Ska du kontakta Endoskopienheten Umeå på 090–785 93 03

Förberedelser på Dagkirurgisk Enhet (DKE) inför undersökningen

- Vi sätter en kanyl i ett blodkärl