

Operation av cellförändringar på livmodertappen, konisation

Cellprov och utredning har visat cellförändringar av en typ som bör tas bort. De kan orsakas av antingen en infektion eller "äkta" cellförändring. Den senare kan på lång sikt (5–10 år) utvecklas till cancer. Det är därför vi behandlar cellförändringen genom att operera bort en liten bit av livmodertappen.

Behandlingen är ett enkelt ingrepp, så kallad konisation, och görs som dagkirurgi. Operationen påverkar inte din förmåga att bli gravid eller föda barn.

Operationsförberedelser

- Duscha och tvätta håret kvällen enligt separat bilaga.
- Du skall inte ha nagellack eller makeup, detta för att man under operationen skall kunna se din hudfärg.
- Du kommer fastande på morgonen till gynmottagningen. Du får inte äta, dricka, röka eller snusa efter klockan 24.00 kvällen innan.
- Om du dagligen tar medicin på morgonen skall den tas som vanligt med några klunkar vatten. Vissa mediciner såsom blodförtunnande mediciner sätts ut innan operationen. Prata med personalen om du undrar vilka mediciner du kan ta.
- Kör ej bil till sjukhuset eftersom medicineffekten sitter i nästan ett dygn efter operationen och du därför inte rekommenderas att köra bil under denna tid.
- Ta med hygienartiklar om du av någon anledning måste bli inlagd på gynavdelningen efter ingreppet.

Hur går operationen till?

- På operationsavdelningen får du lugnande mediciner. Du sövs sedan med ett narkosmedel som sprutas direkt in i blodet. I vissa fall görs operationen i lokalbedövning.
- Via slidan skärs en så kallad kon ut (tunn skiva ca 5 millimeter) längst ner på livmodertappen. Alla synliga cellförändringar tas bort. Ingreppet tar ca 10 minuter. Den borttagna delen skickas för mikroskopisk undersökning.
- När operationen är klar förs du till uppvakningsavdelningen för observation några timmar och sedan tillbaka till gynmottagningen innan du får gå hem.

Efterförlopp

- Innan du går hem får du prata med den läkare som opererat dig för information om ingreppet.
- Du kan känna dig trött efter operationen, men du behöver inte vara sjukskriven.

- Det är normalt med en blodig flytning upp till 2 veckor. Under den tiden skall du inte använda tampong eller ha samlag på grund av infektionsrisken. Du får duscha som vanligt, men inte bada.
- Om blödningsmängden är rikligare än en normal mens, skall du i första hand ta Cyklo F, dessa köps receptfritt på apotek.
- Tabletterna skall halvera blödningsmängden. Om detta inte hjälper ska du kontakta gynmottagningen eller gynavdelningen.

Provsvär

Det tar ungefär 2–3 veckor för att få svar ifrån mikroskopiska undersökningen av konen som tagits bort. Du kommer att kontaktas via brev eller telefon för besked. Om du inte fått besked inom 4 veckor kontakta gynmottagningen.

Återbesök

Återbesök bestäms efter att provsvär kommit.

Kontakt

Telefon gynmottagningen 090-785 91 65 (återuppringningssystem), måndag-fredag klockan 09:00-11:00.

Kvällstid och helger kan du ta kontakt med gynavdelningen, telefonnummer 0950-394 45.