

Förberedelser inför din bronkoskopi

Om undersökningen görs på förmiddagen får du inte äta eller dricka efter klockan 24.00, du ska komma fastande till oss.

Om du fått tid för undersökningen efter lunch får du äta en tidig, lätt/flytande frukost, men ska vara helt fastande från klockan 07.00.

Du får ta viktiga mediciner med lite vatten tidigt på morgonen.

Om du tar blodförtunnande medicin, till exempel Waran, måste du meddela detta till din lungläkare eller till lungmottagningen snarast.

Ta kontakt med din behandlande läkare för korrigerings av din blodförtunnande medicinering.

Tabletter som innehåller acetylsalicylsyra

Du ska undvika läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller motsvarande en tid innan bronkoskopin, eftersom de ökar risken för blödning vid provtagning. Exempelen här nedanför ger vägvisning på hur länge inför ditt besök du måste göra uppehåll med dessa läkemedel.

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| • Aspirin 5 dagar | • Trombyl 5 dagar |
| • Iprel/Ibuprofen 5 dagar | • Diklofenak 5 dagar |
| • Pradaxa 3 dagar | • Naprosyn entero 5 dagar |
| • Bamlan 5 dagar | • Xarelto 48 timmar |
| • Lixiana 48 timmar | • Efient 7 dagar |
| • Treo 5 dagar | • Orudis 5 dagar |
| • Brilique 5 dagar | • Eliquis 48 timmar |
| • Naproxen 5 dagar | • Plavix/Clopidogrel 5 dagar |

Sätt ut _____

_____ dagar/timmar innan undersökningen, dvs. den _____

Efter undersökningen

Inför undersökningen kommer du att få läkemedel som är avslappnande och ett som minskar salivproduktionen (Midazolam och Robinul eller liknande). Du kan därför inte köra bil hem från undersökningen.

Räkna med att du stannar på sjukhuset 2–4 timmar efter undersökningen.

Kom ihåg att ta med dig dina läkemedel, blodsockermätare samt CPAP/Bilevel, om du har sådan utrustning.