

Lungundersökning

Du kommer att få göra ett test av dina lungor, ett så kallat reversibilitetstest.

Ett reversibilitetstest är ett enkelt test för att ta reda på om din lungfunktion förbättras efter inhalation av luftrörsvidgande medicin. Testen går till enligt följande:

1. En enkel lungfunktion (vitalogram) blåses. Man mäter därigenom den totala mängden luft du kan andas ut efter maximal inandning, dels den volym luft du snabbt kan blåsa ut under en sekund.
2. Därefter får du inhalera ett luftrörsvidgande läkemedel. Ta med din egen om du har en sådan.
3. Läkemedelseffekten inväntas under ungefär 20 minuter.
4. Slutligen görs den enkla lungfunktionsmätningen (vitalogram) igen.
5. Resultaten från de båda "blåsningarna" jämförs och bedöms sedan av din läkare.

Förberedelser

För att testen ska bli rättvisa så är det viktigt att följande anvisningar följs:

- Luftrörsvidgande inhalation (sprej eller pulver) såsom Ventoline, Bricanyl, Airomir, Buventol, Salbumatol, Atrovent får inte användas senare än sex timmar innan testen ska genomföras.
- Servent, Bufomix, Seretide Forte, Symbicort, Innovair, Relvar, Duoresp, Formatrix, Atecura eller Oxis får inte användas 24 timmar före testet.
- Luftrörsvidgande tabletter (Bricanyl, Bricanyl Depot, Bambec, Ventoline, Ventoline Depot) och klysma (Teovent, Theofyllamin) får inte användas 24 timmar före testet.
- Tablett Singulair och Montelukast ska du helst inte ta kvällen innan testet.
- Övrig medicinering, inklusive inhalationskortison (Giona, Novopulmon, Pulmicort, Asmanex) och/eller kortisontabletter (till exempel Betapred och Prednisolon) tas som vanligt.

Om du inte klarar av att vara utan ditt/dina luftrörsvidgande läkemedel så länge som vi föreskrivit, ska du givetvis ta den/dem. Det är då viktigt att du meddelar detta till den som gör reversibilitetstesten.

Ta med

Ta med din luftrörsvidgande medicin till besöket.