

Test av luftrören

Du ska få göra ett så kallat metacolintest, detta test görs för att bestämma retbarheten i dina luftrör.

Hur går testet till?

Du kommer att få andas in i dimma av metacolinlösning. Metacolin är ett ämne som har förmågan att reta luftrören. Det är ofarligt och vädras snabbt ur kroppen igen. Mellan varje inandning kommer du att få blåsa ett andningsprov. Om du reagerar på testet hävs reaktionen genast med luftrörsvidgande medicin.

Förberedelser

För att undersökningen skall bli så rättvisande som möjligt är det viktigt att följande anvisningar följs:

Ta inte luftrörsvidgande inhalation (sprej eller pulver) av Ventoline, Bricanyl, Berotec, Airomir, Buventol, Salbutamol, Atrovent, Spiriva eller Ventilastin Novolizer senare än 6 timmar före den tid du fått för undersökningen.

Ta inte heller Servent, Foradil, Seretide, Seretide Forte, Symbicort, Oxis eller Formatrix Novolizer senare än 24 timmar före undersökningen.

Ta inte luftrörsvidgande tabletter (Bricanyl, Bricanyl Depot, Bambec, Ventoline, Ventoline Depot) eller klysma (Teovent, Theofyllamin) senare än 24 timmar före undersökningen.

Tabletten Singulair/Montelukast skall du helst inte ta kvällen innan testen.

Ta all annan medicin du har som vanligt, inklusive Becotide, Pulmicort, Asmanex, Giona Easyhaler, Novopulmon Novolizer och/eller kortison-tabletter (till exempel Betapred och Prednisolon).

Om du inte klarar av att vara utan någon av de mediciner vi skrivit, ta då din medicin.

Du bör inte planera in någon kraftig idrottslig aktivitet på kvällen efter undersökningdagen, eftersom dina luftrör kan vara lite irriterade.