

Aridoltest

Vid besöket på Lung- och allergikliniken kommer du att få genomgå ett Aridoltest. Detta test görs för att bestämma retbarheten i Dina luftrör och innebär att du kommer att få andas in ett pulver från en kapsel och göra ett andningsprov före och mellan varje dos av testsubstans som du andas in.

Pulvret är naturligt förekommande och ofarligt att andas in. Om du reagerar på testet hävs reaktionen genast med luftrörsvidgande medicin.

Förberedelser

För att undersökningen skall bli rättvisande är det viktigt att följande anvisningar följs:

Ta inte luftrörsvidgande inhalationer (sprej eller pulver) av Ventoline, Bricanyl, Berotec, Airomir, Buventol, Salbutamil senare än 8 timmar före den tid du fått för undersökningen.

Ta inte luftrörsvidgaren Atrovent senare än 12 timmar före undersökningen.

Ta inte inhalationskortison, Becotide, Pulmicort, Budesonide, Flutide eller Asmanex senare än 12 timmar före undersökningen.

Ta inte långverkande luftrörsvidgande mediciner i inhalationsform som Oxis eller Serevent, eller kombinationsmediciner som Symbicort forte, Seretide eller Seretide forte senare än 24 timmar före tiden för undersökningen.

Ta inte luftrörsvidgande tabletter (Bricanyl Depot, Bambec, Ventoline Depot) och klysma (Teovent, Teofyllamin) senare än 24 timmar före undersökningen.

Ta inte luftrörsvidgaren Spiriva senare än 72 timmar (3 dagar) före tiden för undersökningen.

Ta inte antihistaminertabletter (tex. Alerius, Zyrlex, Tavegyl, Versal) senare än 72 timmar (3 dagar) före undersökningen.

Ta inte Singulair-tabletter senare än 4 dagar före tiden för undersökningen.

Om du inte klarar av att vara utan mediciner, ta då förstås din medicin.