

Information inför din undersökning

Du har fått tid för binjurevenskateterisering.

Syftet med undersökningen är att utreda orsaken till primär aldosteronism. Blodprover tas direkt från blodkärl i anslutning till båda binjurarna. Huden i ena lumsken lokalbedövas och en kateter läggs in via ett litet snitt. Ur katetern tas sedan prover från både höger och vänster binjureven.

Förberedelser och eftervård sker hos oss på dagvården och undersökningen sker på röntgen.

Läkemedlen Spironolakton och Eplerenon ska sättas ut 6 veckor innan undersökningen. Ibland kan andra läkemedel behöva sättas in tillfälligt.

Innan undersökningen kommer du att få en urinkateter eftersom du behöver ligga stilla i flera timmar under undersökningen. En infart i ett blodkärl i armen kommer att sättas så att du kan få läkemedel genom ett dropp. Du kommer också få lugnande läkemedel som förmedicinering.

Förberedelser

- Du ska lämna prover innan besöket enligt bifogade remisser på hälsocentralen eller laboratoriemedicin. Se datum på bifogad remiss.
- Om du står på blodförtunnande läkemedel är det viktigt att du tar kontakt med oss på dagvården.
- Du ska vara fastande från midnatt inför undersökningsdagen. Mediciner kan tas med lite vatten. Om du har diabetes kan insulindosen behöva justeras.
- På undersökningsdagens morgon ska du göra en dubbeldusch med vanlig flytande tvål. Det innebär att du tvålär in hela kroppen 2 gånger och sköljer av dig däremellan. Ta därefter på dig rena kläder.

Eftervård

Efter undersökningen kommer du tillbaka till dagvården för observation och sängläge under några timmar. Vanligtvis kan du åka hem redan samma eftermiddag/kväll. Vi rekommenderar inte att du kör bil samma dag som undersökningen utförs. Innan du lämnar dagvården får du träffa en endokrinläkare.

På dagvården finns ingen matsservering utan endast enklare fika. Önskas mat får detta medtas. Uppvärmningsmöjligheter finns.