

Undersökning av tjocktarmen

Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel (till exempel Eliquis, Brilique, Clopidogrel, Pradaxa, Waran så ska läkemedlet förmodligen tillfälligt sättas ut före undersökningen. Detta ska framgå på din kallelse. Målvärde för PK-INR vid Waran-behandling är 1,5. Trombyl kan kvarstå.

7 dagar innan undersökning

- Undvik fiberrik kost (kärnor, frön, nötter, grovt bröd, trådiga- och skalomslutna grönsaker/frukter). I övrigt kan du äta som vanligt. Avstå järntabletter.
- Hämta ut laxermedlet Plenvu. Recept finns på valfritt apotek.

Dagen innan undersökningen

Ät en lätt frukost och lunch före klockan 11.00 (ingen fast föda därefter, enbart klar dryck). Klar dryck är: te, kaffe, buljong, saft, juice utan fruktkött, vätskeersättning.

Klockan 15.00 dagen innan undersökningen

- Häll förpackningen med Plenvu dos 1 i en kanna och tillsätt minst 5 dl kallt vatten. Rör om tills allt pulver har löst sig. Gör i ordning 5 dl klar dryck i en annan kanna. Drick varannan klunk/glas av klar dryck och Plenvu under 60 minuter.
- Drick 2 – 3 liter klara vätskor resten av kvällen.

Undersökningsdagens morgon

- Plenvu dos 2 intas 4 timmar innan undersökningstiden.
- Blanda Plenvu dos 2, påse A och B tillsammans, i minst 5 dl kallt vatten. Gör i ordning 5 dl klar dryck i en annan kanna. Drick varannan klunk/glas av klar dryck och Plenvu under 60 minuter.
- Fortsätt dricka 2 liter klara vätskor fram till 1 timme innan undersökningen.
- Om du ska genomföra undersökningen i narkos måste du ha druckit färdigt två timmar innan tiden för undersökningen.

Lång resväg?

Det finns möjlighet att bo på övernattningsrum. Du bokar själv på 0950 – 395 15.

Planera inte för något samma dag som undersökningen då du behöver avsätta hela dagen för besöket hos oss p.g.a. förberedelser, undersökning och eventuell eftervård.

Vissa patienter behöver avslappnande medicin i samband med undersökningen och man får då inte köra bil samma dag. Då vi inte på förhand vet om just du behöver medicin avråder vi dig från att köra bil hit själv utan du behöver hitta ett annat sätt att ta dig till oss. Ta med dig något att äta till efter undersökningen.