

Njurundersökning (iohexolclearance)

Vi finns på Medicinsk och geriatrisk mottagning 3, målpunkt K21, Gastromottagning.

Beräknad undersökningstid totalt 4,5 timme.

Syfte

Iohexolclearance är ett njurfunktionsprov som utförs med hjälp av ett röntgenkontrastmedel.

Information inför undersökningen

Har du varit på röntgenundersökning och blivit injicerad med röntgenkontrast de senaste dagarna kontaktar du oss så senarelägger vi provtagningen eftersom undersökningen då riskerar att ge felaktiga värden. Dosen för funktionsprovet är emellertid bara 1/3 till 1/4 av dosen för en röntgenundersökning.

Du behöver inte vara fastande och en lättare måltid kan intas under tiden provtagningen pågår. Du bör avstå från rökning en timma före och under den tid som prover tas.

Har du eller misstänker du allergi mot jod eller kontrastmedel ber vi dig meddela oss detta snarast. Jod finns bland annat i skaldjur, hushållssalt och i vissa röntgenkontrastmedel. Besvär av injektionen är mycket ovanligt.

Läkemedel

Ta inte diabetesläkemedel Glucophage eller Metformin 48 timmar före undersökningen.

Utförande

- Du får iohexolinjektionen på mottagningen och du bör stanna kvar i cirka en timme.
- Blodprov tas efter tre timmar och sedan tas två blodprover till med 45 minuters mellanrum.
- Du behöver inte vara kvar på sjukhuset mellan provtagningarna.
- Någon större fysisk aktivitet får inte utföras.

Om du vill komma i kontakt med oss

För av- och ombokning är telefonen öppet dygnet runt.

Telefon 090–785 91 78, knappval 4.

Telefontid måndag-torsdag 07.45–12.00, fredagar 07.45–09.25.

Elisabet Stenberg och Elin Enquist

Det går även bra att kontakta oss via webbplatsen 1177.se

