

Förändring av medicinerings före operation

Waran

Uppehåll 3-5 dygn innan operation.

OBS! Ta kontakt med den enhet som sköter din Waran-behandling innan operationen.

Övriga blodförtunnande mediciner och smärtstillande mediciner som även ger en ökad blödningsrisk

Mediciner	Uppehåll innan operation
Albyl minor	7 dygn
Alganex	14 dygn
Alpoxen	2 dygn
Ardinex	1 dygn
Arthrotec	1 dygn
Asasantin Retard	7 dygn
Aspirin	7 dygn
Bamyl	7 dygn
Bamyl koffein	7 dygn
Bamyl S	7 dygn
Bamyl S koffein	7 dygn
Brexidol	14 dygn
Brilique	7 dygn
Brufen	1 dygn
Buprefarm	1½ dygn
Buprenorfine	1½ dygn
Clopidrogel	5 dygn
Cloriocard	5 dygn
Diklofenak	1 dygn
Efient	7 dygn
Eliquis®	2 dygn.
Grepid	5 dygn
Ibumetin	1 dygn
Ibuprofen	1 dygn
Ipren	1 dygn

Mediciner	Uppehåll innan operation
Klopidrogel	5 dygn
Magnecyl	7 dygn
Magnecyl-koffein	7 dygn
Modifenac	1 dygn
Naprosyn	2 dygn
Naproxen	2 dygn
Norspanplåster	1½ dygn
Orudis	1 dygn
Orudis Retard	2 dygn
Piroxikam	14 dygn
Plavix	5 dygn
Pradaxa®	4 dygn.
Prodon	1 dygn
Pronaxen	2 dygn
Relifex	9 dygn
Temgesic	1½ dygn
Tenoxikam	14 dygn
Ticlid	10 dygn
Tradil	10 timmar
Treo	7 dygn
Treo Comp	7 dygn
Trombyl	3 dygn
Voltaren	1 dygn
Xarelto	3 dygn