

Buckybehandling

Buckystrålarna som används kallas gränsstålar. Har en våglängd som ligger mellan det ultraviolette ljuset och vanliga röntgenstrålning. Dessa strålar tränger endast in cirka 1 mm i huden, vilket dock är tillräckligt för behandling av många hudsjukdomar.

Buckybehandlingen ges i en serie behandlingar 1 gång i vecka under 4–6 veckor. Det är viktigt att fjälla av hudförändringar inför behandlingen annars riskerar man att strålarna fastnar i fjällen. Vid behandlingstillfället ska huden vara avfjälld, torr och obehandlad. Använd därför inga salvor på morgonen före buckybehandlingen.

Buckybehandlingen brukar vanligen kombineras med kortisonkräm, salva eller lösning enligt din läkares ordination.

Biverkningar

Ibland kan viss irritation och rodnad uppstå. Relativt ofta ser man en pigmentering som efter solbränna. Denna går bort av sig själv ungefär som en vanlig solbränna. Hos mörkhyade personer kan dock denna pigmentering bli uttalad.

Beträffande eventuella långtidsbiverkningar har man inte kunnat se några risker med denna behandling.

Kom ihåg

Det är viktigt att hudförändringar med tjocka fjäll och beläggningar är ordentligt avfjällande då buckystrålarna annars hamnar i fjällen och inte gör någon nytta.