

Information inför gastroskopi

Vid en gastroskopi undersöks magsäcken med hjälp av en böjlig slang som läkaren för in genom munnen och matstrupen ner till magsäcken. Genom gastroskopet kan läkaren se magsäcken från insidan och vid behov fotografera och ta prov från slemhinnan. Undersökningen kan till exempel visa om du har en inflammation eller ett sår i magen.

Det finns de som tycker att undersökningen är obehaglig. I så fall kan du prata med personalen om det. Det finns hjälp att få med till exempel lugnande läkemedel. Om du fått lugnande eller smärtstillande läkemedel får du inte köra bil hem själv. Ordna i så fall så att någon närstående kan hämta dig efter undersökningen.

Viktigt

Om du är insulinbehandlad diabetiker ska du kontakta mottagningen för att få en förmiddagstid.

Förberedelser

- Du får inte äta eller dricka från klockan 24.00 dagen innan undersökningen. Magsäcken måste vara tom vid undersökningen.
- Du får inte använda snus efter klockan 24.00 dagen innan undersökningen.
- Du som använder mediciner för hjärtat, lungorna, högt blodtryck eller epilepsi ska ta dem som vanligt fram till 2 timmar före undersökningen. Därefter får du inte ta mediciner.
- Du som har diabetes och behandlas med tabletter ska inte ta blodsockersänkande tabletter på undersökningens morgon.
- Om din undersökningstid är efter klockan 12.00 på dagen får du dricka fram till 5 timmar före undersökningen.

Kontakt med mottagningen

Om du har frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta oss.